

Dræn anlæggelse i trommehinden

Ved gentagne mellemørebetændelser eller vedvarende væske i mellemøret med efterfølgende smerter og nedsat hørelse kan det blive nødvendigt at anlægge dræn i trommehinderne. Drænet bevirker bedre ventilation af mellemøret og dermed langsom normalisering af slimhinden i mellemøret. Trommehinden vil efterhånden igen kunne svinge frit og hørelsen dermed blive normal.

Ved **feber og hoste** på operationsdagen kontakt klinikken.

Før operationen:

Af sikkerhedsgrunde skal mavesækken være tom ved operationen. Dvs. barnet må spise som aftalt ved for undersøgelsen.

Se regler for faste under det pkt. på hjemmesiden.

Hvis der er udleveret Pamol stikpille skal den gives 1 time før operation.

Bolcher, tyggegummi og lign. er forbudt i fasteperioden.

Se film om bedøvelse på www.HCAND.dk

Under operationen:

Indgrebet foregår i fuld narkose givet på maske. Indsovningen varer under 1 minut. Drænet, der er et par millimeter langt, placeres i en lille slidse i trommehinden efter mellemøret er suget tomt for slim og evt. pus.

Efter operationen:

Senere på dagen vil barnet være upåvirket af operationen.

De første par dage efter operationen kan det flyde fra øret med slim, pus eller blod.

Flyder det mere end 3 dage, bedes du/I kontakte klinikken med henblik på behandling.

Kontrol:

8 UGER efter operationen skal patienten møde til kontrol. Herefter vil jævnligt kontrollere ørerne, indtil drænet er faldet ud af selv. Forældrene er selvfølgelig velkomne til at kontakte klinikken ved tvivlsspørgsmål.

VÆR **OPMÆRKSOM** PÅ AT MAN GERNE MÅ BADE/ SVØMME MED DRÆN MEN IKKE DYKKE !