

Reduktion af mandler (tonsillotomi)

Hvis halsmandlerne er voldsomt forstørrede, kan det være nødvendigt med en operation. Forstørrede halsmandler hos børn kan medføre spisebesvær, vejrtrækningsbesvær, snorken og pauser i vejrtrækningen under søvn. Denne operation foregår under fuld bedøvelse. Indgrebet gennemføres gennem munden, som holdes åben ved hjælp af en mundspærre, der trykker tungen ned. Mandlerne deles med en elektrisk kniv.

Før operationen:

Af sikkerhedshensyn skal mavesækken være tom ved operationen. Patienten må spise og drikke som aftalt ved forundersøgelsen.

Se regler for faste under det pkt. på hjemmesiden.

Hvis der er udleveret stikpiller skal disse gives 1 time før operationen.

Se film om bedøvelse på www.HCAND.dk

Børn skal gerne være ledsaget af 2 voksne.

På operationsdagen:

Patienten vil blive observeret på klinikken, indtil hans/hendes tilstand er stabil. Ørelægen ringer senere på dagen.

Efter hjemsendelse må der spises kold og blød kost de første døgn.

Efter operationen:

Efter operationen kan drøblen føles mere fyldig end normalt (vandig hævelse) og tungen kan føles tykkere efter trykket fra mundspærren. Kigger man sig i halsen efter operationen, vil man kunne se bløde grå-gullige sårskorper. Disse belægninger er en del af helingsprocessen og kan give dårlig ånde. Sårene heler i løbet af ca. 10 dage. Der må beregnes 4 dages rekreation. Dette betyder, at man skal holde sig i ro og børn skal passes hjemme. Kosten skal i de første dage være blød; dvs. franskbrød uden skorpe, pasta, farskød eller lign. HUSK at afkøle maden.

KONTROL efter 8 uger.

VIGTIGT:

I tilfælde af blødning der ikke stopper på is, skal du ringe **112**