

Smertestillende:

Hvis der er behov for smertestillende, vil Pamol / Panodil efter vægt være velegnet.

Der kan komme lidt brunligt sekret fra næsen de første dage.

Ved blødning som ikke stopper på is ringes **112**



PIA JUUL SKOV

LOTTE JUNG JOHANSEN

ØRELÆGERNE FISKETORVET

FISKETORVET 4-6 5.SAL

5000 ODENSE C

KONSULTATION MELLEM 8.30-15.00

TIDSBESTILLING : 66140166

Man-torsdag kl. 8-10 samt 13-14

Fredag kl. 8-10

ELLER : www.orelaegernefisketorvet.dk

ØRELÆGERNE

FISKETORVET

D R Æ N

O G

P O L Y P P E R

O p e r a t i o n s d a g

_ _ _ d a g d . _ _ / _ _

K I _ _ _ _

FJERNELSE AF POLYPPER OG DRÆN ANLÆGGELSE

Ved gentagne mellemørebetændelser eller vedvarende væske i mellemøret med efterfølgende smerter og nedsat hørelse kan det blive nødvendigt at anlægge dræn i trommehinderne. Drænet bevirker bedre ventilation af mellemøret og dermed normalisering af slimhinden i mellemøret. Trommehinden vil efterhånden igen kunne svinge frit og hørelsen dermed blive normal.

Fjernelse af polypper (sidder næsesvælget oppe bag den bløde gane). Operationen kommer på tale ved gentagne, langvarige mellemøreproblemer eller vedvarende besværet/ophævet vejrtrækning gennem næsen. Polypperne fjernes ved udskrabning gennem munden. Indgrebet foregår i fuld bedøvelse.

Før operationen:

Ved feber og hoste kontakt klinikken.

Af sikkerhedshensyn skal mavesækken være tom ved operationen. Dvs. barnet må **spise**

Indtil kl.....

Der må **drikkes saft/vand** **indtil kl.....**

Den udleverede **Panodil stikpille** gives

kl.....

Bolcher, tyggegummi og lign. er forbudt i fasteperioden

Børn skal være ledsaget af min. 1 voksen.

Ved feber og hoste kontakt klinikken Se evt. Finn skal bedøves på Sundhed.dk



Efter operationen:

Barnet vil blive observeret på klinikken, indtil hans/hendes tilstand er stabil.

Efter operationen kan drøblen føles mere fyldig end normalt (vandig hævelse), og tungen kan føles tykkere efter trykket fra mundspærren. Senere på dagen ringer ørelægen og hører til patienten. Når I kommer hjem må barnet drikke og spise is, yoghurt og lign. Blød kold kost.

Dagen efter må barnet spise normalt.

Efter operationen skal barnet passes hjemme i mindst 1 døgn. Der vil sjældent efter det første døgn være behov for smertestillende.

Kontrol efter aftale.